

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2015 13:44 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 10:56

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A λέγεται **περιοδική**, όταν υπάρχει πραγματικός αριθμός $T > 0$ τέτοιος, ώστε για κάθε $x \in A$ να ισχύει:

- $x + T \in A$, $x - T \in A$ και

- $f(x + T) = f(x - T) = f(x)$

Ο πραγματικός αριθμός T λέγεται περίοδος της συνάρτησης f .

Οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$, $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι περιοδικές με περίοδο $T = 2\pi$,

ενώ οι συναρτήσεις $h(x) = \epsilon\phi x$ και $v(x) = \sigma\phi x$ είναι περιοδικές με περίοδο $T = \pi$.

Θεωρία

Οι συναρτήσεις της μορφής $\rho \cdot \eta\mu(\omega x)$ και $\rho \cdot \sigma\upsilon\nu(\omega x)$

□

σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2015 13:44 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 10:56

Σε μια συνάρτηση της μορφής $f(x) = \rho \eta \mu \omega x$, όπου $\rho, \omega > 0$:

(i)

Το ρ καθορίζει τη μέγιστη τιμή της, που είναι ίση με ρ και την ελάχιστη τιμή της που είναι ίση $\square \square \square$ με $-\rho$.

(ii)

Το ω καθορίζει την περίοδο της συνάρτησης που είναι ίση με $\square 2\pi \omega$.

Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για μια συνάρτηση της μορφής $\square f(x) = \rho \sigma \upsilon \nu \omega x$, όπου $\rho, \omega > 0$

\square

Γενικά για τις συναρτήσεις της μορφής $g(x) = \alpha \cdot f(x)$ και $h(x) = f(\alpha \cdot x)$, όπου f συνάρτηση με γνωστή γραφική παράσταση.